# Station du Languedoc-Roussillon. Directeur-gérant : L. Bouya. Imprimerie de

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-7-66 521241

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON** 

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72) (AUDE, AVEYRON, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES) Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER. C. C. P.: MONTPELLIER 5.238-57

25 F Nº 70 Juillet 1966/34 4 ène suppliment Aveyron - Lozère

#### POHIL DE TERRE

Le Nilliou de la porme de terre n'a pas encore provoqué des attaques graves dans les plantations. Méanneins, un développement important est souvent à craindre en fin de végétation. Apporter une nouvelle couverture anticryptogemique notament dans les régions où des chutes de pluies importantes ont été enregistrées. He pas relâcher la cadence des traitements dirigés contre le Doryphore.

#### VICE

Apporter une nouvelle couverture anticryptogamique.

#### ARBRES PRUITTERS A PAPILIS

Le Carpocapso fait preuve d'une grande activité. Il est donc nécessaire de ne pas relâcher la cadence des traitements. Assurer de même la protection contre les acariens.

#### TORDEUSE ORIENTALE

La lutte contre cet insecte doit être réalisée sur les fruits (pêches et poires) arrivant à naturité au cours de la deuxième quinzaine d'Acût.

#### MOUCIE DES FRUITS

Cet insecte dont les dégâts sont très visibles dans les vergers méridionaux risque de commettre des dégâts importants ; les plantations voisines des agglomérations seront les premières touchées. Il faut donc préventivement exécuter deux traitements 3 semaines et 10 jours avant la récolte.

A MOMTPHLLHER le 20 Juillet 1966

de Calvro, Alredo, eco ...

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, P. BERVILLE

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles H. MEZUT P229 LL. TROUTLLON

LIEVORI AMIOUS LACRATO MRES

#### TEICHE DU POIREAU

Contre ce parasite les traitments deivent être exécutés à une cadence de 10 jours environ avec un des produits suivants : Carbaryl - D.D.T. - Organo-phosphorés (autorisés en cultures maraîchères).

#### MOUCHE DE L'OIGION

Pour protéger les oignons de ce parasite des traitements doivent être exécutés en cours de végétation. Utiliser un organo phos horé autorisé en cultures maraîchères (Diethion, Parathion, Diazinon, Carbophénothion, etc ...).

### SEPTORIOSE DU CELERI NI PERSIL

Dans les secteurs hunides où la maladie est à craindre, procéder à des traitements avec un des fongicides suivants : Carbathne, Cuprobane, Doguadine, Mancozèbe, Manèbe, Oxyquinoléate de Cuivre, Zirane, etc ....

remaining and and the Contrôleurs of the Contrôleurs

JHRESTIAN - LAVY

ment hier, and increa anotheranalist ach noticion and independent a deministration at he bear and